

Estudio del uso de omeprazol en farmacia comunitaria de la costa de Girona.

Frigola Castillon M, García-Jiménez E, Daviu Dutres A, Moreno-López A, González-García L.

Introducción: Los inhibidores de la bomba de protones son fármacos de consumo elevado y en crecimiento progresivo en el Sistema Nacional de Salud. De los cinco representantes del grupo, el Omeprazol es el de mayor prescripción porque su efectividad, tolerancia y seguridad están plenamente avaladas por su amplia experiencia de uso en los últimos 19 años.

Objetivos: Determinar el porcentaje de pacientes que usa Omeprazol de acuerdo con los criterios de uso, así como el perfil del paciente que lo solicita, la patología por la que se demanda y la percepción que tiene de su efectividad.

Método: Estudio observacional Descriptivo transversal, realizado a pacientes mayores de 18 años que acuden solicitando Omeprazol de 1 de Mayo a 27 de Junio del 2008 en la farmacia de Calella de Palafrugell. Los datos se procesaron en SPSS V.15, estableciéndose significación estadística con $p < 0,05$, utilizándose la t de Student y Chi cuadrado.

Resultados: La edad media del paciente que solicita Omeprazol es de 60 años, de nivel cultural alto, 2 problemas de salud de media y 4 medicamentos. La patología mas prevalente es la Dispepsia Funcional en el 36% de las solicitudes; hernia de hiato la padece el 20,7% y úlcera gastroduodenal el 4,9% de la muestra. La demanda de Omeprazol por tratamiento es del 10% de las solicitudes, en prevención 62%, y mantenimiento el 27%.

Un 28% de la muestra no cumple con los criterios de uso del Omeprazol y un 8,5% se automedica. El 68% de los usuarios de Omeprazol lo utiliza de forma continua, siendo la duración media del tratamiento de 5 años. En el momento de la adquisición, el 86,6% de los casos, los pacientes no presentaban ningún síntoma, y el 91% de la muestra cree que el medicamento controla su problema de salud.

Conclusión: Nueve de cada diez demandas de Omeprazol han sido para prevención y mantenimiento. En el momento de la solicitud el 86,6% de las veces no hay síntoma, y los pacientes lo usan una media de 5 años. Por esto se deberían potenciar las revisiones de tratamiento anualmente, así como la revisión de las dosis en tratamientos continuados.

Publicaciones relacionadas:

- Frigola Castillón M. Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Universidad de Granada. Septiembre 2008.
- Frigola Castillón M, Daviu Dutres A, García-Jiménez E, Moreno-López A, González-García L. Estudio del uso de Omeprazol en Farmacia Comunitaria de la costa de Girona.

Comunicación Póster. Congreso Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Madrid.
Octubre 2008.

Si desea obtener, de forma gratuita el documento del DEA, contacte con el investigador principal, a través de la sección de contacto de Melpopharma en:
<http://www.melpopharma.com/contacto.php>